Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Général Maths + SI, veuillez visiter :
bac-maths-si.fr/annales-sujets-et-corriges

Baccalauréat épreuve de spécialité (terminale)

Sujet jour 1

Métropole – La Réunion – 8 septembre 2026

A. P. M. E. P.

Exercice 1 — 5 points

Dans cet exercice, les résultats seront arrondis à 10^{-1} près.
Les parties A, B et C sont indépendantes les unes des autres et peuvent donc être traitées séparément.

Partie A

On s'intéresse au respect des délais de livraison de colis à domicile dans une agglomération.
Une étude a permis d'établir que :

- lorsque le livreur est expérimenté, le délai de livraison est respecté pour 95 % des colis ;
- lorsque le livreur est débutant, le délai de livraison est respecté pour 75 % des colis.

Dans une entreprise qui emploie ses propres livreurs parmi lesquels 60 % sont expérimentés et les autres sont débutants, on s'intéresse à une livraison choisie au hasard.
On note :

- E l'évènement : « la livraison est effectuée par un livreur expérimenté » ;
- R l'évènement : « le délai de livraison est respecté ».

1. Calculer $P(E \cap R)$.
   On pourra s'appuyer sur un arbre de probabilité.
2. Justifier que $P(R) = 0{,}87$.
   Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
3. Sachant qu'un colis a été livré en respectant les délais de livraison, quelle est la probabilité qu'il ait été livré par un livreur expérimenté ?

Partie B

Dans le but d'améliorer le service livraison, l'entreprise analyse un échantillon de 200 livraisons prises au hasard parmi celles effectuées par un livreur expérimenté sur une période donnée.
On rappelle que la probabilité qu'un livreur expérimenté respecte les délais de livraison est 95 %.
On suppose que le nombre de colis est assez important pour que l'on puisse assimiler le choix de cet échantillon à des tirages successifs avec remise.
On note X la variable aléatoire égale au nombre de colis livrés en respectant les délais de livraison parmi les livraisons de cet échantillon.

1. Justifier que la variable aléatoire suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. L'évènement « tous les colis ont été livrés en respectant les délais de livraison » est-il un événement impossible ? Justifier.
3. Donner $P(X \geqslant 190)$ puis interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie C

Deux zones géographiques sont desservies sans que les livraisons dans l'une n'aient d'incidence sur celles dans l'autre :

- en zone A, les délais de livraison sont respectés dans 85 % des cas ;
- en zone B, les délais de livraison sont respectés dans 90 % des cas.

L'entreprise observe 120 livraisons effectuées en zone A et 80 livraisons effectuées en zone B.
On note :

- X_A la variable aléatoire comptabilisant le nombre de colis livrés respectant les délais de livraison en zone A ;
- X_B la variable aléatoire comptabilisant le nombre de colis livrés respectant les délais de livraison en zone B ;
- $S = X_A + X_B$ la variable aléatoire donnant le nombre total de colis livrés respectant les délais de livraison.

On admet que X_A suit une loi binomiale $\mathscr{B}(120\,;0{,}85)$ et que X_B suit une loi binomiale $\mathscr{B}(80\,;0{,}90)$

1. Calculer l'espérance et la variance des variables X_A et X_B.
2. Calculer $E(S)$.
3. Quelle condition permet d'affirmer que $V(S) = 22{,}5$?
4. À l'aide d'une inégalité de Bienaymé-Tchebychev, minorer $P(S \in [165\ ;\ 183])$ et interpréter le résultat.

Exercice 2 — 5 points

Partie A

Soit f la fonction définie sur $]-3\ ;\ +\infty[$ par :

$$f() = \frac{2x}{x+3}.$$

On admet que f est dérivable sur $]-3\ ;\ +\infty[$.

1. Vérifier, en détaillant les calculs, que pour tout réel x de $]-3\ ;\ +\infty[$, $f'(x) = \dfrac{6}{(x+3)^2}$.
   En déduire que f est croissante sur $]-3\ ;\ +\infty[$.

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = f(u_n)$.

2. Démontrer, par récurrence, que pour tout entier n, on a : $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 1$.
3. En déduire que (u_n) est convergente.

Partie B

On admet que pour tout entier naturel n, $u_n \neq 0$.
On note (v_n) et (w_n) les suites définies pour tout entier naturel n par :

$$v_n = \frac{1}{u_n} \quad et \quad w_n = v_n + 1.$$

1. Vérifier que, pour tout entier naturel n, $\quad v_{n+1} = \dfrac{3}{2}v_n + \dfrac{1}{2}$.

2. Démontrer que (w_n) est une suite géométrique dont on précisera les paramètres.

3. En déduire que, pour tout entier naturel n,

$$u_n = \frac{1}{2\left(\frac{3}{2}\right)^n - 1}$$

4. Déterminer la limite de la suite (u_n).

5. **a.** Recopier et compléter le script suivant de telle sorte que la fonction seuil() renvoie le plus petit entier n tel que u_n soit inférieur ou égal à 10^{-3}.

```
1  def seuil():
2    n = 0
3    u = 1
4    while ...:
5      n = n + 1
6      u = ...
7    return ...
```

b. Quelle est la valeur renvoyée par la fonction `seuil()` ?

Exercice 3 — 4 points

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Les affirmations sont indépendantes.
Pour toutes les questions, l'espace est muni d'un repère orthonormé.

1. Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$ trois vecteurs de l'espace .

Affirmation 1 : Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ forment une base de l'espace.

2. Soit quatre points de l'espace :

$$\text{A}(1\,;2\,;3),\ \text{B}(2\,;0\,;1),\ \text{C}(0\,;1\,;2),\ \text{D}(0\ ;\ 4\ ;\ -1)$$

On admet que les points A, B et C ne sont pas alignés.
Affirmation 2 : La droite (CD) est orthogonale au plan (ABC).

3. Soit d une droite de l'espace dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x &= 2t \\ y &= -2+4t \\ z &= -2+t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}$$

Soit P_1 le plan de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$ et passant par E(1 ; 1 ; −1).

Affirmation 3 : L'intersection de la droite d et du plan P_1 est le point M(2 ; 2 ; −1).

4. Soit N(2 ; 0 ; −2) et H(1 ; −2 ; 0) deux points de l'espace.
Soit P_2 le plan d'équation cartésienne $x+2y-2z+3=0$.
Affirmation 4 : La distance de N au plan P_2 est NH.

Exercice 4 — 6 points

On peut traiter indépendamment les parties A et B.

Partie A

On considère l'équation différentielle :

$$(E) : \quad 2y' + 3y = 8\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$$

où y est une fonction de la variable y et elle est définie et dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$.

1. Résoudre dans l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ l'équation différentielle

$$(E') : \quad 2y' + 3y = 0.$$

2. Soit f la fonction dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$, définie par

$$f(t) = 4t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}.$$

On admet que cette fonction f est une solution de l'équation différentielle (E).
On considère une fonction g définie et dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$.
Démontrer que : « g est solution de (E) »est équivalent à « $g - f$ solution de (E') ».

3. En déduire toutes les solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer toutes les solutions de (E) qui s'annulent en 0.

Partie B

Un essai clinique est réalisé auprès de plusieurs patients volontaires afin de valider ou non l'efficacité d'un médicament.
On demande au patient d'avaler le médicament sous la forme d'un comprimé de 1 mg puis on étudie la quantité de ce médicament présente dans le sang au cours du temps.
La quantité de ce médicament en fonction du temps écoulé après la prise du comprimé, en mg, est modélisée par la fonction f dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$, définie par :

$$f(t) = 4t\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t},\ t \text{ étant exprimé en heures.}$$

1. Déterminer $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)$.
Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

2. **a.** Vérifier en détaillant les calculs que pour tout réel t positif, $f'(t) = (4-6t)\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}t}$.

b. Étudier le signe de la dérivée et en déduire le tableau de variations de la fonction f sur $[0\ ;\ +\infty[$.

c. Au bout de combien de temps la quantité de ce médicament présente dans le sang est-elle maximale ?

3. Démontrer que l'équation $f(t) = 0{,}5$ admet une unique solution sur $[1\,;3]$.
Donner un encadrement de cette solution, notée α, à 10^{-2} près.

4. L'essai clinique sera validé si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

— Condition 1 : 50 % de la quantité du médicament est éliminée de l'organisme au plus tard 2 heures après la prise du comprimé.

— Condition 2 : la quantité moyenne du médicament présente dans le corps du patient entre 1 heure et 3 heures après la prise du comprimé est inférieure à 0,40 mg.

La condition 1 est-elle réalisée ?
La condition 2 est-elle réalisée ?

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.